

DIGETOP

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DIGETOP

Per favorire la digestione e ridurre l'acidità gastrica.

Allevia e attenua i sintomi riconducibili ad una eccessiva presenza di gas a livello gastrointestinale, riducendo l'acidità gastrica.

DIGETOP

È un dispositivo medico che contiene:

come azione tensioattiva il **Simeticone**, che per la sua attività antischiumogena, è utilizzato per alleviare i sintomi riconducibili ad una eccessiva presenza di gas a livello gastrointestinale facilitandone l'eliminazione, diminuendo la tensione superficiale dell'aria intrappolata nel muco e nel bolo alimentare, togliendo gonfiori di stomaco, flatulenza, distensione e dolore addominale ed eruttazione.

Come azione tamponante il **Calcio Carbonato**, il **Citrato di Potassio** e il **Citrato di Sodio**, che neutralizzano gli acidi gastrici mediante una reazione chimica acido-base andando ad attenuare i sintomi quali bruciore di stomaco, dolore allo stomaco, crampi, borborigmi, senso di tensione.

POSOLOGIA:

Assumere 1 o 2 bustine orosolubili subito dopo i pasti principali o al momento in cui si avvertono i sintomi di bruciore e/o dolore.

MODALITÀ D'USO:

Il contenuto della bustina deve essere posto direttamente sulla lingua, questo ne consente l'impiego senz'acqua.

COMPOSIZIONE:

Sorbitolo, Calcio carbonato, Sodio citrato tribasico, Biossido di silicio, Simeticone, Acido citrico, Sodio bicarbonato, Maltodestrine, Aroma limone, Citrato di potassio, Sucralosio, Acesulfame K.

AVVERTENZE

Non utilizzare per periodi prolungati.

Non superare le dosi consigliate senza aver sentito prima il parere del medico.

Nei casi di ipercalcemia e di insufficienza renale, consultare il medico prima dell'utilizzo.

Se i sintomi persistono consultare il medico.

Non somministrare ai bambini.

Il dispositivo potrebbe interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale.

Si consiglia pertanto di consultare il medico ed in ogni caso attendere circa 2 ore prima di assumere un farmaco. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'assunzione.

Non utilizzare oltre la data impressa sulla confezione e sulle bustine.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

CONTROINDICAZIONI:

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso uno o più componenti del prodotto.

Non sono note reazioni avverse nell'utilizzo del dispositivo. In caso di reazioni, interrompere l'assunzione e consultare il medico.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore ed al riparo dall'umidità.

SMALTIMENTO:

Il dispositivo scaduto o da eliminare deve essere gestito secondo le regole locali di smaltimento per tale tipologia di prodotti.

Contiene 14 bustine da 2,3 grammi



Rev: Giugno 2020



FARTO Srl

Farmaco Biochimico Toscano

Viale Alessandro Guidoni, 97 - FIRENZE - ITALIA

www.fartosrl.com